

POSOLOGÍA Y PRESCRIPCIÓN

A continuación se le detalla la prescripción y
✓ posología que deberá aplicar según lo que indique la receta digital que podrá descargar más abajo.

● En caso de tomar protector gástrico (OMEPRAZOL / PANTOPRAZOL, etc.), tomar la medicación 30 minutos después.

● Ud. puede tomar cualquiera de los siguientes ANALGÉSICOS (**ELIJA SOLO UNA opción**):

- ✓ IBUPROFENO 600 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas x48 horas), **siempre y cuando no sea alérgico/a**
- ✓ IBUPROFENO 400 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas x48 horas), **siempre y cuando no sea alérgico/a**
- ✓ PARACETAMOL 1 gr (tome 1 comprimido cada 12 horas x48 horas), **siempre y cuando no sea alérgico/a**
- ✓ PARACETAMOL 500 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas x48 horas), **siempre y cuando no sea alérgico/a**
- ✓ KETOROLAC 10 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas x48 horas o hasta que calme el dolor), **siempre y cuando no sea alérgico/a**
- ✓ KETOROLAC sublingual (tome 1 comprimido cada 8 horas x48 horas o hasta que calme el dolor, colocándolo debajo de la lengua), **siempre y cuando no sea alérgico/a**



POSOLOGÍA Y PRESCRIPCIÓN

- Además, debe tomar ANTIBIÓTICOS para disminuir la infección, por un plazo de 7 a 10 días.
- **TOME SOLO UNA de las opciones (siempre y cuando, no sea alérgico/a):**
- ✓ AMOXICILINA 1 gr (tome 1 comprimido cada 12 horas)
- ✓ AMOXICILINA 500 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas)
- ✓ AMOXICILINA CLAVULÁNICO 1 gr (tome 1 comprimido cada 12 horas)
- ✓ AMOXICILINA CLAVULÁNICO 500 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas)
- ✓ AZITROMICINA 500 mg (tome 1 comprimido por día, durante 6 días)
- En caso de que el ANALGÉSICO no llegue a cubrir las 8 horas, usted puede combinarlo con otro, con un rango de 4 horas entre cada uno.
- Ej.: Tome 1 comprimido de IBUPROFENO y tras 4 horas tome 1 comprimido de PARACETAMOL o 1 comprimido de KETOROLAC, o viceversa (x48 horas).
- Mantenga la boca desinfectada con enjuagues bucales (2/3 veces por día, durante 7 días)
- ✓ Agua oxigenada de 10 volúmenes (la de las heridas) diluida con agua común (50% y 50%)
- ✓ Colutorio con CLORHEXICIDINA al 2% (Plac out / Listerine)
- Cepillado: 3 veces por día



POSOLOGÍA Y PRESCRIPCIÓN

Otras recomendaciones

- Si usted toma pastillas anticonceptivas, las mismas podrían disminuir su efecto al tomar ANTIBIÓTICOS. Por favor, use además otro método anticonceptivo
- Si usted es celíaco/a, por favor lea en el prospecto, la composición de los excipientes, para verificar que son libres de T.A.C.

